



Болаларда сон суяги бўйинчаси синишларида перкутант остесинтез марказ мисолида уч йилик таҳлили

¹С.Т. Худайберганов

²А.С.Тоштемирович

³Тоштимеров Аслбек
Содик ўғли

¹Худайберганов Содик Тоштимерович –
Республика Ихтисослашган Травматология ва
Ортопедия Илмий Амалий Тиббиёт

²Маркази Самарқанд Филиали олий тоифали
травматолог ортопеди, тиббиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

³Самарқанд давлат тиббиёт университети
Даволаш факултети 1 курс талабаси

Болаларда сон суяги пороксимал синишлари 1% ташкил қилади болалар сон суяги бўйинчаси синиқлари 15% ташкил қилади. Болаларда сон суяги бўйинчаси синиқлари кўпирақ 7 ёшда катталарда учрайди. Сон суяги бўйинчаси синиқларини скелет тортма қўйиб ёпиқ усулда тўғирлаб перкутант остесинтез қилаганимизда сон суяги бошчасининг асептик некрози кам учради. Бизнинг кузатуларимизда 2022-2024-йиллар давомида 27 та бемор болаларни кузатик 7 ёшдан 14 ёшгача. Жинси бўйича ўғил болаларда кўпирақ учради шулардан ўғил болалар 15(55%) қиз болалар 12(45%).



Шунингдек, болалар турмуш жароҳатлари билан йиқилиб травма олганлар (21 та-78%) йўл улов жароҳати билан (6 та-22%) ёши бўйича қўйидаги гуруҳларга бўлиб ўрганганимизда 7-10 ёшда 5(19%) та 11-14 ёшда 18(67) та 15-18(14%) синишлар ўнгда 13 та чапда 14 тани ташкил қилди. Бизлар барча беморларни ёпиқ

усулда даволади яни беморларда биринчи суткадан беморларга склет тортма кўйилиб танадан узоклаштирган ҳолатда кўйилади. Беморларни операцион столда ёпиқ усулда репозиция қилиниб ЭОП назорати остида суяк синиклари репозиция бўлгандан сўнг ЭОП назоратида сон суяги бўйинчасига 5 та Илизаров кегайлар ёпиқ усул билан фиксация қилинади. Кегайлар 90 С⁰ бурчак остида қайрилиб тери ичига қолдирилди. Барча беморларга иммобилизация мақсадида пласткли чанок сон гипсли боғламаси кўйилади, ва 2-2,5 ой туради гипсли боғалм ечилгандан сўнг 4-5 ойдан кейин беморларни оёғни босиб юришга рухсат берилади. Кузатуларимизда 27 та беморларимиздан 2(8%) тасида сон суяги бошчаси асептик некрози кузатилди 4 беморимизда кегайлар тери остига бўрти туриб маҳаллий қизаришлар кузатилди. Барча беморларимиздан кегайлар 8-10 ойларда олиб ташланади, беморлар индивудал ёндашилади. Асептик некрозга учраган 2та беморларимизда физотерапевтик муолажалар олди ва секинлик билан некрозга учраган қисмида тикланишлар рўй берди. Болаларда сон суяги бўйинчасини очик усулда оператив даволасда кўпирок асептик некроз учрайди ёпиқ усулда оператив даволганда камроқ учради. Беморларини шифохонада жинси бўйича ўғил болаларда кўпирок учради ўртача ётиш муддати 6-7 кун ташкил қилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.В. Каплан Повреждения костей и суставов
2. М.В. Волков В.Д. Дедова Детская ортопедия